

AV/0305

COMPOSICION DE LA GALLINAZA CON DIFERENTES TIPOS DE CAMA EN COSTA RICA

NUTRIENTE	TIPO DE CAMA			
	BORUCHA	SIN CAMA Deshidratada	TOTAL	
			PROMEDIO	DE
Humedad %	12,60	10,20	10,40	4,40
Cenizas %	28,50	29,60	29,50	9,00
Fibra Cruda %	15,90	10,60	11,30	5,70
Extracto Etéreo %	1,00	1,70	1,70	0,90
E.L.N. %	22,80	28,80	28,30	6,80
Proteína Cruda %	14,50	17,80	17,20	6,10
Calcio %	5,44	6,29	6,13	2,78
Fósforo %	1,00	2,18	2,05	0,77
Cobre mg7kg	--	34,00	34,00	7,00
Hierro mg7kg	3 585,00	5 316,00	5 027,00	2 409,00
Zinc mg/kg	283,00	215,00	226,00	84,00
Magnesio %	--	0,46	0,46	0,15
Manganeso mg/kg	--	486,00	486,00	65,00
Sodio mg/kg	--	180,00	180,00	--
Potasio %	2,00	2,01	2,01	0,18
DIVMS %	--	86,40	86,40	--
TDN Bovinos %	--	39,60	39,60	8,30
ED Bovino Kcal/kg	--	1 748,00	1 748,00	364,00
EM Bovino Kcal/kg	--	1 369,00	1 369,00	375,00



MAG



PROGASA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

BOLETIN INFORMATIVO SOBRE EL USO DE SUBPRODUCTOS

FUENTE: Base de datos de composición de alimentos CINA. 1993.

NOTA: Información adaptada de investigaciones realizadas por el Dr. Emilio Vargas del CINA-UCR.

LA GALLINAZA

Adaptado por:
Ing. Johnny Hernández Alvarado
Ing. Argerie Cruz Méndez

**PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL
ING. JOHNNY HERNANDEZ O LA ING. ARGERIE CRUZ .
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
APDO. 10094-1000, SAN JOSE, COSTA RICA
FAX (506) 296 0858. E. MAIL: argerie@hotmail.com**

1997