

Anaplasmosis y Babesiosis

Enfermedad causada por parásitos presentes en el torrente sanguíneo del animal. Hay dos tipos de transmisión, uno por garrapatas del género Babesia, y otros por moscas picadoras, mosquitos, tábanos, y garrapatas del género Anaplasma y también por agujas y material quirúrgico contaminado.


SÍNTOMAS

- Anemia.
- Fiebre.
- Decaimiento.
- Falta de apetito (Anorexia).
- Parálisis ruminal (se paraliza la digestión).
- Se puede presentar además hemoglobinuria, que es orina color coca cola en los bovinos parasitados por la garrapata Babesia.
- Frecuencia respiratoria aumentada.
- Mucosas pálidas.
- En vacas preñadas es frecuente el aborto.
- Depresión.

- En animales adultos muerte repentina.
- En el peor de los casos la muerte.

PREVENCIÓN

El control debe estar orientado al mantenimiento de una población mínima de garrapatas de manera que no causen daño a los animales, con el propósito de mantener en alerta permanente las defensas contra estos hemoparásitos.



Riñón afectado

TRATAMIENTO

Uso de antibióticos en el caso de Anaplama, Oxitetraciclina y además, Hierro, Cobalto Vitamina B12. En el caso de Babesia se debe usar aminobencenos.

Utilizar agujas y jeringas esterilizadas.

Para mayor información consulte a su médico veterinario



Agente transmisor: garrapata

PLATICAR

Plataforma de Tecnología, Información y Comunicación Agropecuaria y Rural



Telefax: 231-3991 www.platicar.go.cr