

# Brucelosis

## ZOONOSIS

**E**s una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria. Es transmisible al ser humano por consumir leche contaminada sin pasteurizar o hervir, por contacto con fluidos o abortos de hembras infectadas. Conocida también como aborto infeccioso, aborto contagioso, Abortus bang.

## SÍNTOMAS

### En hembras:

- Aborto en el último trimestre de la preñez.
- Nacimiento prematuro.
- Terneros nacidos vivos pero débiles.
- Terneros nacidos muertos.
- Disminución en la producción de leche.

### En machos:

- Inflamación de testículos y epidídimos.
- Disminución del deseo sexual e infertilidad.

## PREVENCIÓN

- a. • Vacunar las terneras entre 4 y 18 meses de edad.
- Revacunación a los 6 meses de aplicada la primera dosis,


siempre y cuando no estén gestantes.

- b. • Medidas higiénicas (cuidados).
- Rotación anual del potrero de parición.
- Detección y recolección del campo de fetos abortados y placentas.
- Buena higiene en los corrales y lugares de ordeño.

- c. • Muestreo de sangre y eliminación de los animales positivos con ayuda de su veterinario.

## TRATAMIENTO

*El mejor tratamiento es la prevención. Para mayor información consulte a su médico veterinario.*



Aborto infeccioso

