

Parásitos Internos

Los parásitos causan una pérdida en la producción en los animales adultos y una pérdida de desarrollo en los animales jóvenes, hasta llegar a causar la muerte en casos muy severos. El productor debe comprender que curar cuesta caro, por lo que hay que tratar en lo posible, de impedir las enfermedades parasitarias antes que se presenten.

Los parásitos internos o endoparásitos, viven dentro de los animales y tienen que obtener el alimento de este para sobrevivir y multiplicarse. Cada especie de parásito ataca un lugar preferido dentro del animal, como en el rumen, el intestino, los pulmones y el hígado.

Los nematodos, son del grupo de parásitos internos más comunes en el ganado. Las hembras adultas, que se encuentran alojadas en el intestino, ponen miles de huevos que son expulsados con la boñiga. En la boñiga los huevos se convierten en larvas infectantes para los bovinos ya que se hospedan en el pasto.

SINTOMAS

Los síntomas clínicos de un animal parasitado son los siguientes:

- Diarrea que ensucia el tren posterior y el rabo
- Decaimiento.
- Pérdida de peso
- Deshidratado en grado variable
- Huesos que se pueden doblar con alguna facilidad
- Pelo hirsuto (seco, quebradizo y desordenado).

PREVENCIÓN

El estado nutricional de los animales debe ser de bueno a excelente para tener resistencia a los parásitos. Llevar a cabo un estricto programa de desparasitación con el producto adecuado en el momento oportuno.

TRATAMIENTO

Con productos a base de LEVAMISOL, los cuales matan los parásitos de la panza, del intestino y los pulmones. La administración puede ser oral o inyectable. Las desventajas son que no matan los huevos, matan muy pocas larvas. No actúan contra tenias.

Productos a base de BENSIMIDAZOLES, los cuales matan parásitos de la panza intestino y pulmones. Actúan contra huevos, larvas y adultos, tienen poca toxicidad, algunos de estos matan tenias.

Productos a base de AVERMECTINAS, los cuales matan parásitos del pulmón, panza e intestino. No tiene efecto sobre tenias, período de latencia prolongado (por lo que no se debe usar en vacas de lechería).

Programa de vacunación

- A los 3 o 4 meses de nacido, que es cuando el ternero comienza una alimentación más dependiente del pasto que de la leche de la madre.
- Destete. El estrés de la separación de la madre hace que el animal se infecte más fácilmente de parásitos.

- Con intervalo de 3 o 4 meses después del destete.
- Dosificaciones en la muda de dientes (18 a 20 meses).
- Desparasitar las novillas antes de ponerlas al toro.
- Desparasitar todo el hato antes de ponerlas al toro, en las fincas donde haya monta controlada o en cambio de estación.
- Desparasitar adultos (más de 24 meses) durante la época de verano.

Para mayor información consulte a su médico veterinario

