

## Fe de errata

### REVISTA AGRONOMÍA COSTARRICENSE 30(2)

En el artículo **NITRÓGENO ORGÁNICO Y QUÍMICO EN SORGO NEGRO CON COBERTURA PERMANENTE DE MANÍ FORRAGERO. II. FRACCIONAMIENTO DE LA PROTEÍNA**, los nombres de los tratamientos en el cuadro 1 presentan errores, por lo que la versión correcta del cuadro es la siguiente:

Cuadro 1. Distribución de las fracciones de la proteína del sorgo Negro con respecto a la fuente y dosis de fertilizante nitrogenado.

TRATAMIENTO	CONTENIDO DE PC (%)	FRACCIONAMIENTO DE LA PROTEINA				
		Unidades de PC (%)				
		A	B <sub>1</sub> *	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	C*
Sin fertilización	9,36	0,74 <sub>ab</sub>	0,57	2,21 <sub>c</sub>	4,11 <sub>a</sub>	1,73
300 kg N-químico ha <sup>-1</sup> .año <sup>-1</sup>	10,17	0,93 <sub>a</sub>	0,41	2,74 <sub>a</sub>	4,17 <sub>a</sub>	1,92
150 kg N-orgánico ha <sup>-1</sup> .año <sup>-1</sup>	9,1	0,73 <sub>ab</sub>	0,41	2,57 <sub>ab</sub>	3,70 <sub>a</sub>	1,69
225 kg N-orgánico ha <sup>-1</sup> .año <sup>-1</sup>	9,07	0,76 <sub>ab</sub>	0,42	2,35 <sub>bc</sub>	3,82 <sub>a</sub>	1,72
300 kg N-orgánico ha <sup>-1</sup> .año <sup>-1</sup>	8,86	0,51 <sub>b</sub>	0,41	2,53 <sub>ab</sub>	3,73 <sub>a</sub>	1,68

\*Valor de F es muy pequeño, no se detecta diferencias.