

EFECTO DE RASTROJOS EN EL NITRÓGENO DE BIOMASA MICROBIANA EN UN AGROECOSISTEMA ARROCERO INUNDADO¹

Rodolfo Quirós-Herrera², Carlos Ramírez-Martínez³

RESUMEN

Efecto de rastrojos en el nitrógeno de biomasa microbiana en un agroecosistema arrocerero inundado. Del año 2002 al 2004 se investigó en un agroecosistema arrocerero inundado a fin de evaluar cambios en la actividad de la biomasa microbiana y su contenido de nitrógeno "N", durante cuatro ciclos consecutivos del cultivo. Se comparó la tendencia del contenido de nitrógeno de la biomasa microbiana "NBM" en los sistemas siembra directa sobre rastrojos "SDR" y labranza mecanizada convencional "LMC". Durante el tercer ciclo de arroz se evaluó el efecto de los rastrojos de mucuna "*Mucuna deeringiana* (Bort.) Merr"; se comparó la materia orgánica del suelo "MOS" y el NBM. Adicionalmente, durante el cuarto ciclo de arroz del estudio, fueron contrastados cambios en la actividad de la biomasa microbiana en tres diferentes etapas de crecimiento del cultivo. En los primeros 5 cm del perfil del suelo la cantidad de NBM siempre fue mayor en SDR. En esta capa del suelo, la combinación de rastrojos de arroz acumulados durante tres ciclos con rastrojos de mucuna del ciclo previo, permitió una mayor estratificación de la MOS. Se observó un incremento de la MOS de 2,3 a 4,1%, mientras que el NBM fue casi cuatro veces mayor. La respiración de los microorganismos del suelo y la mineralización del N fue afectada principalmente por la presencia continua de una lámina de agua sobre el suelo. Se concluyó que la SDR es un sistema capaz de complementar la fertilización química e incrementar los rendimientos del arroz mediante la gradual liberación de N y otros nutrientes derivados de la descomposición de los rastrojos.

Palabras clave: Rastrojos de arroz, biomasa microbiana del suelo, siembra directa, nitrógeno, mucuna.

ABSTRACT

Rice stubble and changes in nitrogen microbial biomass in a flooded rice agroecosystem. From 2002 to 2004, a research was carried out in a flooded rice agroecosystem in order to evaluate changes in the microbial biomass activity and its nitrogen content (N), during four consecutive crop cycles. The trends of nitrogen content of the microbial biomass (NMB) in direct seeding into stubble (DSS) and conventional mechanized tillage (CMT) were compared. During the third rice cycle, the effect of mucuna (*Mucuna deeringiana* (Bort.) Merr) stubble was assessed, comparing the soil organic matter (SOM) and NMB. In addition, changes in the activity of microbial biomass through the growth stages of the rice crop during the fourth cycle were compared. Within the first 5 cm of the soil profile the amount of NBM was always greater for DSS. In this soil layer, the combination of rice stubbles accumulated during 3 cycles with mucuna stubbles from the previous cycle allowed a greater stratification of SOM. An increment from 2.3 to 4.1% was observed for SOM, while NBM quadrupled. Soil microorganism's respiration and N mineralization were primarily affected by the continuous presence of a water layer over the soil. It was concluded that SDR is a system capable of complementing the chemical fertilization and increasing rice yields through the gradual release of N and other nutrients from stubble decomposition.

Key words: Rice stubble, microbial biomass, direct seeding into stubble, nitrogen mineralization, respiration.



¹ Recibido: 28 de marzo, 2005. Aceptado: 18 de julio, 2006. Parte de la tesis del primer autor. Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Universidad de Costa Rica.

² Estudiante programa de doctorado en sistemas de producción agrícola tropical sostenible "SPDATS", Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: rodolfo.quirós@costarricense.cr

³ Correo electrónico: carlosm20@gmail.com

INTRODUCCIÓN

A pesar de que algunos cultivos pueden crecer hasta su madurez en soluciones de nutrimentos, la mayoría de las plantas terrestres se establecen y fructifican cultivadas sobre el suelo. Generalmente el suelo no provee todas las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de los cultivos y es necesario realizar aportes de fertilizantes que permitan mejorar la posibilidad de obtener altos rendimientos. La deficiencia de nutrimentos esenciales o la presencia de éstos en cantidades limitadas, reduce la masa de raíces y tallos producidos por los cultivos durante su desarrollo. El efecto de los nutrimentos, tanto en el crecimiento vegetativo como reproductivo de las plantas, y particularmente del nitrógeno "N" es mayor a medida que concentraciones apropiadas de éstos sean alcanzables por las raíces del cultivo.

Según Norman *et al.* (2003), de los macronutrimentos tomados del suelo el N es el más importante en el crecimiento del arroz (*Oryza sativa* L.). Generalmente el N es absorbido en grandes cantidades por las plantas de arroz en forma de amonio " NH_4^+ " y nitrato " NO_3^- ", y es de vital importancia para la productividad del cultivo. Su concentración media en la planta es de 1,34; 1,8 y 0,49% en granos, hojas y tallos respectivamente (Anders *et al.* 2004). El amonio y nitrato disueltos en agua constituyen la fracción más importante del N disponible en la solución del suelo. Su concentración puede ser modificada principalmente cuando: 1) hay aportes debidos a la mineralización de la materia orgánica del suelo (MOS) por acción de microorganismos, 2) se aplican fertilizantes nitrogenados, 3) el N es inmovilizado por la biomasa microbiana del suelo "BMS", 4) al ser absorbido por las plantas, 5) incrementa o decrece la cantidad de agua en el suelo.

El N prácticamente se halla ausente del material original de los suelos, y excluyendo la fertilización nitrogenada, su presencia se debe fundamentalmente a la actividad biológica de los microorganismos del suelo. Hay indicios de fijación biológica no simbiótica de N asociada a la descomposición de los rastrojos del arroz (Yamaguchi 1979). Cuando ocurre la descomposición de los rastrojos y se mineraliza la MOS se libera N y otros nutrimentos, lo cual favorece una nutrición más balanceada del arroz. Debido a que los microorganismos del suelo forman parte integral de la MOS, su actividad puede aportar N en forma natural y más sostenible que la fertilización nitrogenada.

La MOS sirve como fuente de energía y nutrimentos para microorganismos del suelo como bacterias, hongos, protozoarios y nemátodos (Doran y Parkin 1994). Éstos junto con macroorganismos y raíces de plantas forman la fracción viviente de la MOS, y en general constituyen más del 70% de la misma (Theng 1987). Los microorganismos del suelo contienen el 3% del N almacenado en los ecosistemas terrestres y su actividad heterotrófica en los suelos es responsable de la mineralización de la MOS, proceso que en forma natural libera NH_4^+ a la solución del suelo (Zak *et al.* 1994). Más del 50% del N utilizado por el arroz inundado puede ser derivado de la mineralización de la MOS por bacterias (IRRI 1990).

Aunque en forma temporal los microorganismos del suelo compiten con el cultivo al consumir e inmovilizar el N y otros nutrimentos, después de que tales seres vivientes completan su ciclo vital y mueren, mediante la descomposición de sus tejidos liberan a la solución del suelo los nutrimentos antes inmovilizados, en formas disponibles para las plantas. En adición al suministro de N y otros nutrimentos, la MOS contribuye a estabilizar los agregados y mantener abiertos los macroporos necesarios para la infiltración del agua, lo cual ayuda a reducir la escorrentía y la erosión. A pesar de que estas razones no son siempre conocidas, generalmente los suelos son más fáciles de manejar cuando el contenido de MOS es alto, especialmente en las zonas tropicales (Johnson 1991).

La biomasa microbiana del suelo (BMS) es una fracción de la MOS que puede afectar significativamente la fertilidad del suelo, pues controla fuertemente la mineralización de la MOS y la tasa de liberación de N, por este motivo constituye a la vez una fuente y sumidero de éste y otros nutrimentos (Fornasier *et al.* 2002). Por las razones mencionadas, el N contenido en la BMS constituye un indicador importante en el estudio de la fertilidad del suelo. En cualquier terreno la dinámica de los componentes bióticos es afectada por factores ambientales tales como; características del suelo, la temperatura, y formas de manejo de los rastrojos. Cuando a través del laboreo y la incorporación de los rastrojos dentro del perfil del suelo se disturba el equilibrio biológico, se ocasionan cambios en la composición y actividad de la BMS, con distintas implicaciones en su fertilidad en el corto y largo plazo (Leita *et al.* 1999).

El sistema de labranza del suelo afecta la velocidad de la descomposición de la MOS (Etana *et al.*

1999). La labranza ocasiona disturbios al suelo y una mayor tasa de descomposición de los rastrojos en comparación con terrenos sin labrar. La continua labranza del suelo conduce a menor nivel de agregación y estabilidad física de la MOS (Carter *et al.* 1998). Con la preparación física del suelo en la labranza mecanizada convencional (LMC) se incrementa de manera eflmera la biomasa microbiana, produciendo mayor cantidad de reacciones concurrentes de inmovilización, mineralización y estabilización (Voroney *et al.* 1989). La oxidación biológica en conjunto con la erosión puede ocasionar pérdidas de MOS equivalentes a la mitad de la fuente natural (Tiessen *et al.* 1994). El rápido agotamiento de la MOS podría afectar negativamente la calidad del suelo y reducir la productividad del cultivo (Bayer *et al.* 2001).

Las frecuentes alteraciones del suelo provocadas por la labranza en LMC, hacen que las tasas de descomposición de los rastrojos y la mineralización de la MOS sean generalmente más rápidas que en SDR pero de corta duración. En LMC los rastrojos y la MOS son mezclados y distribuidos de manera homogénea dentro de todo el perfil del suelo afectado por la labranza. Los procesos de descomposición en este caso son dominados por bacterias, las cuales tienen menor eficiencia en la asimilación de nutrientes que los hongos (Gale y Cambardella 2000). Se presume que en corto tiempo las reservas de MOS son consumidas por las bacterias y si los productos de su descomposición no son oportunamente aprovechados por el cultivo, pueden perderse del agroecosistema.

Debido a que en el sistema de siembra directa sobre rastrojos (SDR) la preparación física del suelo es mínima y mayor cantidad de residuos vegetales permanece en la superficie, la descomposición de la MOS es más lenta que en LMC. La reducción en la intensidad de la labranza y el uso de sistemas de cultivo que maximicen la adición de residuos a la superficie del terreno, han sido prácticas eficientes para mantener o incrementar la MOS (Bayer *et al.* 2001). A medida que transcurren más ciclos de cultivo en SDR, se produce una mayor concentración de MOS en la capa del suelo más cercana a la superficie, mientras que en LMC ésta se distribuye de manera uniforme en todo el perfil afectado por la labranza. El grado de estratificación de la MOS en el perfil puede indicar la calidad del suelo debido a que su acumulación en la superficie es esencial para controlar la erosión, incrementar la

infiltración del agua y regular la disponibilidad de nutrientes (Franzluebbers 2002).

Cuando las condiciones ambientales son adecuadas, la actividad de los microorganismos del suelo y el potencial para la mineralización de la MOS son mayores en el horizonte superficial, en comparación con el resto del perfil. Conforme se produce la acumulación de los rastrojos en la superficie, los microorganismos tienen a disposición más sustrato para actuar, y a través de su descomposición, progresivamente van incrementando la fracción orgánica del suelo, con una marcada estratificación en las capas de suelo menos profundas. Los rastrojos superficiales son descompuestos principalmente por hongos, los cuales tienen una alta eficiencia de asimilación de N y otros nutrientes (Gale y Cambardella 2000). Una mayor concentración de MOS cerca de la superficie, permite en un proceso continuo de mineralización, mayor cantidad de NBN en SDR con respecto a LMC.

Otro factor determinante a considerar en la actividad de la BMS en agroecosistemas cultivados con arroz es el efecto del agua, de manera particular en terrenos bajo inundación con lámina de agua continua. En ambientes de este tipo un decrecimiento de la capacidad natural del suelo para suplir N podría reducir la productividad del arroz bajo inundación en forma intensiva y continua (Cassman *et al.* 1995). En los agroecosistemas arroceros que permanecen inundados durante la mayor parte del cultivo, la condición anaeróbica predominante hace que las poblaciones y la actividad microbiana sean diferentes a cultivos de arroz en secano, y posiblemente con impactos distintos en la disponibilidad del N en el suelo.

En arroz inundado el suelo se mantiene bajo una lámina de agua continua desde el momento en que las plántulas de arroz han completado su emergencia hasta dos semanas antes de la cosecha. En ese lapso la ausencia de oxígeno en el suelo restringe la actividad de microorganismos aeróbicos y la descomposición de los rastrojos es más lenta, posiblemente porque sólo pueden mantenerse activos los anaeróbicos y los aeróbicos facultativos. Debido a que en la región del estudio las temperaturas generalmente se mantienen altas (28°C), con muy leves variaciones durante el año, éstas normalmente son favorables para la descomposición de rastrojos y por tanto no parecen ser un factor limitante para la actividad microbiana.

Desde la cosecha del arroz hasta la siembra del ciclo siguiente el terreno generalmente se mantiene drenado. En condiciones normales la humedad del suelo únicamente corresponde al remanente del cultivo anterior y a la aportada por las lluvias. Si la humedad es adecuada, los procesos de descomposición de rastrojos y mineralización de la MOS podrían incrementarse durante ese período, porque en condiciones predominantemente aeróbicas la actividad de los microorganismos aeróbicos es mayor. Una manera de optimizar la descomposición de los rastrojos del arroz es aprovechar el lapso de descanso entre ciclos del cultivo, cuando los terrenos no son utilizados con fines productivos, intercalando la siembra de una planta leguminosa a manera de abono verde.

Los métodos tradicionales para cuantificar la MOS no permiten estimar en forma adecuada la cantidad de nutrimentos que se produce con su mineralización ni cuánto de éstos son directamente aprovechados por el cultivo (Theng 1987). La MOS consiste en un complejo de compuestos, con fracciones vivientes (microorganismos, raíces de plantas, macroorganismos) y no vivientes (humus y macromateria orgánica). Sin embargo, las fracciones más lábiles, particularmente la BMS, constituye un mejor indicador de los efectos de las prácticas de labranza y la lámina de agua en las transformaciones de la MOS.

Puesto que una proporción significativa del N disponible en el suelo se deriva de la mineralización de la MOS (Cabrera *et al.* 1994), conocer la cantidad de N mineralizable es importante para determinar la dosis de fertilizante que optimiza los rendimientos del cultivo, sin incrementar la alteración ambiental por pérdidas de este elemento y la consecuente contaminación de suelos y aguas. Varios estudios indican que en la mayoría de los suelos la MOS se correlaciona con la BMS (Anderson y Domsch 1989; Wardle 1992; Meléndez 1997; Salas y Ramírez 1999). En consecuencia, a través de mediciones de BMS se puede inferir su nivel de actividad y estimar la intensidad a la cual la MOS está siendo mineralizada (Uribe 1999).

Por otra parte, varias especies leguminosas son usadas como cultivos de cobertura o abonos verdes para mejorar la fertilidad del suelo e incrementar la producción del arroz (Palaniappan y Siddeswaran 1999). La mucuna "*Mucuna deeringiana* (Bort.) Merr." es una especie leguminosa que permite incrementar los

rendimientos del arroz en un 25%. Esta leguminosa florece entre 45 y 50 días después de la siembra y produce hasta 5 t/ha de rastrojos (Singh *et al.* 1995). En campos arroceros inundados, el cultivo de leguminosas como abonos verdes puede efectuarse durante los períodos cuando no se siembra arroz, en lapsos de descanso del terreno entre la cosecha de un ciclo y la siembra del siguiente ciclo arrocerero. La siembra de mucuna como abono verde, intercalada entre dos ciclos del cultivo comercial, mejora la descomposición de los rastrojos del arroz, e incrementa el N disponible en el suelo derivado de la mineralización de la materia orgánica (Ladha *et al.* 2000). Esto conduce a una mejor calidad productiva del terreno, lo cual permite elevar la eficiencia en la fertilización nitrogenada y mayores rendimientos en la cosecha del arroz.

Si se admite que el efecto de los rastrojos de arroz que quedan acumulados sobre la superficie del terreno en SDR es distinto a cuando éstos son incorporados dentro del perfil del suelo, tal como ocurre en LMC, entonces al mantener los rastrojos sobre el suelo en vez de incorporarlos dentro del perfil, se lograría una tasa de descomposición más lenta, que permitiría un flujo más regulado de la liberación del N orgánico en el suelo. Una forma de comprobar esta hipótesis consiste en investigar si existen diferencias significativas en la tasa de descomposición de los rastrojos y la mineralización de la MOS entre los sistemas de preparación del terreno para el cultivo SDR y LMC. La tasa de descomposición de los rastrojos se regularía por efecto de la labranza en LMC y la ausencia de ésta en SDR.

Con el objetivo de evaluar el efecto de la labranza y los rastrojos de arroz en los sistemas mencionados, en este estudio se determinó la cantidad de nitrógeno de la biomasa microbiana (NBM) durante cuatro ciclos consecutivos de arroz inundado. Además se evaluó el efecto en la descomposición de los rastrojos de arroz acumulados durante tres ciclos de cultivo previos, al ser combinados rastrojos de mucuna, una leguminosa con capacidad de fijación biológica de N atmosférico. Para esto se determinó el contenido de MOS y NBM antes y después de la siembra de mucuna. Adicionalmente, durante el último ciclo de arroz en estudio, a través de determinaciones de mineralización del N y respiración de la BMS, se evaluaron cambios en la actividad de los microorganismos del suelo en tres distintas etapas de desarrollo del arroz.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características del sitio en estudio

La etapa experimental del estudio se desarrolló entre enero del 2002 y mayo del 2004, en un agroecosistema arrocero de la hacienda el Pelón de la Bajura, en la Región Pacífico Norte de Costa Rica. El sitio corresponde a la zona de vida bosque húmedo premontano transición basal tropical y presenta topografía plana, con elevaciones medias de 10 a 20 msnm, ubicado entre las coordenadas verticales 381-384 y 267-274 horizontales de la hoja Tempisque⁴. Según datos de la estación hidrometeorológica local⁵, la temperatura media anual presentó pequeñas fluctuaciones, con una media de 27,6 °C y valores mínimos y máximos respectivos de 22,9 a 34,7 °C; la precipitación media fue de 1.722 mm/año, con el 66% de las lluvias concentradas en junio, setiembre y octubre; la humedad relativa varió entre 61 y 90%. La textura del suelo en el área del experimento fue francoarcillosa (33% arena, 29% limo, 38% arcilla), con color gris oscuro a negro en el perfil estudiado. El pH del suelo fue de 6,5 y la capacidad de intercambio catiónico (CICE) de 22,2 cmol(+)⁶.

Arreglo experimental

El experimento se realizó en un lote arrocero cultivado a escala comercial con arroz bajo inundación con lámina de agua continua, identificado como Playitas. En este lote se instaló un par de parcelas permanentes cuadradas con 4.900 m² de superficie cada una, separadas entre sí por bordes de 10 metros de ancho. El arreglo experimental consistió en parcelas contiguas asignando los sistemas SDR y LMC a cada parcela, con cinco repeticiones por lote. Las parcelas fueron divididas en 49 subparcelas cuadradas con 100 m² de área efectiva cada una, y en forma aleatoria se seleccionaron cinco subparcelas por sistema de siembra para efectuar los respectivos muestreos de suelo.

Manejo del arroz

En la cosecha del arroz se usó una cosechadora con secciones articuladas, capaces de desprender los granos del arroz sin cortar los tallos, las cuales dejaron en forma casi intactas las cañas en pie y la mayor parte del follaje. Sólo la granza (cascarilla del arroz) y pequeños trozos de hojas o tallos fueron retirados del sitio por la cosechadora. Mediante muestreo y determinación del peso de la biomasa seca aérea, se estimó la cantidad de rastrojos de malezas y de arroz que quedaron sobre el terreno al final de cada ciclo de cultivo. Según el método de línea transecto (Shelton *et al.* 2000) la cobertura del suelo lograda por los rastrojos en todos los casos evaluados fue mayor al 60%. La biomasa de raíces (rastrojos subsuperficiales) no fue considerada en este estudio debido a la dificultad para manipular suelos de textura pesada.

Para controlar el crecimiento de la vegetación y los rastrojos, en las parcelas bajo SDR en cada ciclo del estudio se efectuó una aplicación total de herbicida sistémico postemergente, cinco días, antes de la siembra. Se aplicó glifosato a razón 3 kg/ha de producto formulado 68 SG en 200 l/ha de agua. El cultivo fue sembrado manteniendo el total de rastrojos de arroz remanentes de la cosecha previa junto con las malezas desecadas por el tratamiento herbicida. En sitios tratados con LMC el suelo fue preparado mediante una pasada de rastra rompedora, una de rastra afinadora y finalmente un pase de rodillo compactador. Para incorporar completamente los rastrojos se empleó una rastra con 40 discos de 98 cm de diámetro. En la superficie del terreno no quedó en forma visible restos de rastrojos ni malezas.

En los ciclos evaluados se utilizó una sembradora SEMEATO TDNG 420, calibrada para sembrar 180 kg/ha de semilla certificada de arroz. Para activar la germinación del cultivo se aplicó riego intermitente durante tres a cuatro semanas después de la siembra. Al inicio del ensayo los terrenos fueron micro nivelados para asegurar uniformidad en la cobertura con una lámina de agua de 10 cm de altura, la cual se mantuvo en forma continua una vez que las plántulas alcanzaron el estado de cuatro hojas. De acuerdo al programa de fertilización de la finca, para asegurar un adecuado suministro de fósforo, potasio y magnesio, al momento de la siembra se fertilizó con 50, 125 y 8 kg/ha de súper triple fosfato, sulfato de potasio y óxido de magnesio respectivamente.

⁴ Instituto Geográfico Nacional. 1973. Mapa básico de Costa Rica, Hoja Tempisque (3147-III), escala 1:50,000.

⁵ Estación hidrometeorológica instalada en la Hacienda El Pelón de la Bajura, Bagaces, Guanacaste.

⁶ Análisis realizados en el Laboratorio de Suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas. UCR.

Manejo de mucuna

La mucuna se cultivó entre los meses de abril a julio, para lo cual se aprovechó el período entre las siembras de arroz de temporada seca y lluviosa, cuando normalmente el terreno se mantiene en descanso sin cultivo comercial. Después de la cosecha del arroz se realizó una aplicación total con herbicida glifosato, a razón de 3 kg/ha de producto formulado 68SG en 200 l/ha de agua, a fin de controlar el crecimiento de rebrotes en la soca y en las áreas bajo LMC se efectuó la labranza del terreno. Tanto en LMC como en SDR se sembró mucuna en forma manual, a razón de 30 kg/ha, en este último caso bajo los rastrojos del arroz. Para promover la germinación de las semillas se efectuó mojes frecuentes del terreno inmediatamente después de la siembra. Sin aplicar fertilización química, se permitió el crecimiento de las plantas leguminosas hasta alcanzada la fase floración, a 120 dds (días después de la siembra). En ese momento se realizó otra aplicación de glifosato, a la misma dosis anterior, para controlar el crecimiento del cultivo leguminoso e inducir la descomposición de sus rastrojos. Mediante muestreo y determinación del peso de la biomasa seca aérea, se estimó el peso de los rastrojos de mucuna en 690 kg/ha. El levantamiento de muestras en el campo se efectuó a 30 días después de iniciada la descomposición de los rastrojos de mucuna.

Muestreo del suelo

Al inicio de cada ciclo de cultivo, cinco días antes de introducir la lámina de agua permanente al arrozal, se tomó muestras compuestas de suelo distribuidas al azar, en cinco puntos de muestreo por subparcela, entre 0 y 5 cm de profundidad. Debido a que en SDR el contenido de MOS se concentra en la capa superficial del suelo, se consideró que en el ámbito de profundidad elegido en el presente estudio es donde existe mayor posibilidad de observar asociaciones entre las variables a evaluar. Cada muestra compuesta con un peso aproximado de 500 g se empacó en bolsas plásticas debidamente identificadas y se envió inmediatamente al laboratorio, para los respectivos análisis. Durante el cuarto ciclo del estudio fueron efectuados muestreos complementarios al momento de la siembra, floración y antes de la cosecha del arroz. El primer muestreo se realizó con el terreno húmedo a capacidad de campo, mientras que en los

últimos dos las muestras fueron tomadas con el suelo cubierto por la lámina de agua.

Características evaluadas

Durante los cuatro ciclos consecutivos de cultivo que abarcó el estudio se evaluó el contenido de MOS (%) y el nitrógeno de la biomasa microbiana NBM (mgN/kg de suelo). Adicionalmente, en el último ciclo evaluado se determinó la mineralización de nitrógeno (MN) (mgN/kg suelo día) y la respiración de la biomasa microbiana (RBM) (mgC/kg suelo día). Para determinar el NBM se empleó el método de "Fumigación – extracción" en el cual las muestras de suelo son expuestas a vapores de cloroformo para destruir las membranas de los microorganismos y liberar al medio los contenidos celulares de N, para ser extraído y evaluado. La técnica de respiración fue utilizada en este estudio como variable indicadora de la actividad total de los microorganismos del suelo (Uribe 1999). Los análisis de laboratorio fueron efectuados en el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Con los datos obtenidos se efectuó pruebas de comparación de medias entre sistemas de siembra y fechas de muestreo, así como análisis de correlación entre las respectivas variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados son presentados en tres secciones correspondientes a los principales objetivos planteados en el estudio. En la primera sección se presenta la variación en la cantidad de NBM, según el sistema de labranza utilizado y el momento de muestreo. También se contrasta los cambios observados en el contenido de MOS y NBM por efecto de los rastrojos de una siembra de mucuna entre dos ciclos de cultivo del arroz. En las últimas dos secciones se compara las tasas de mineralización de nitrógeno y respiración de la BM del suelo, durante las fases de siembra, floración y precosecha del cultivo.

Cambios en la cantidad de biomasa microbiana de nitrógeno

La cantidad de NBM determinada en la capa de suelo comprendida entre 0 y 5 cm de profundidad, presentó variaciones que fluctuaron entre 12 y 32 kg/ha durante el período evaluado (Figura 1). Las determinaciones

