

## EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD Y ESTABILIDAD DE 14 HÍBRIDOS DE MAÍZ, AZUERO, PANAMÁ<sup>1</sup>

Román Gordón-Mendoza<sup>2</sup>, Ismael Camargo-Buitrago<sup>3</sup>, Jorge Franco-Barrera<sup>4</sup>, Andrés González-Saavedra<sup>4</sup>

### RESUMEN

**Evaluación de la adaptabilidad y estabilidad de 14 híbridos de maíz, Azuero, Panamá.** Se sembró un ensayo a través de nueve ambientes contrastantes de la Región de Azuero durante el ciclo agrícola 2005-2006, con el objetivo de seleccionar los híbridos de maíz con mayor estabilidad y adaptabilidad en esta región. El material genético consistió de 14 híbridos blancos y amarillos. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones, las parcelas experimentales consistieron de dos surcos de 5,2 m de largo, separadas a 0,8 m. Se realizó un análisis de varianza combinado y las medias se separaron utilizando la DMS. Para estimar la adaptabilidad y estabilidad de híbridos y ambientes, se usó el modelo AMMI y la técnica GGE Biplot-SREG. Los análisis estadísticos indicaron diferencias significativas ( $P < 0,01$ ) entre genotipos, ambientes y la interacción Genotipo-Ambiente, indicando la respuesta diferencial de los híbridos ante los diferentes ambientes. El híbrido PB-0105 sobresalió del resto de los híbridos con un promedio de 8,01 t/ha. A este genotipo le siguieron el grupo de híbridos formados por 30S-40, PB-0103, P-0512, P-0102, 30F-80 y DK-466 con rendimientos superiores a las 7,0 t/ha. El análisis de estabilidad identificó al híbrido P-0102 como el más estable. El análisis de la precipitación durante el desarrollo del cultivo, definió tres grupos de localidades en relación al estrés sufrido en la fase de floración (51-80 dds) y llenado del grano ( $>80$  dds). El grupo de tres localidades que no fue afectado por el estrés hídrico superó en 1,21 y 2,02 t/ha a los otros dos grupos ambientales.

**Palabras clave:** Maíz, híbridos, Biplot GGE-SREG, estabilidad, efecto de precipitación pluvial.

### ABSTRACT

**Adaptability and stability assessment of 14 corn hybrids, Azuero, Panama.** An experiment was established across nine contrasting environments in Azuero during 2005-2006, to select corn hybrids with the best stability and adaptability on the Azuero Region. The genetic materials consisted in 14 white and yellow corn hybrids. A Completely Randomized Block Design with three replications was used. The experimental plots consisted of two rows of 5.2 m of length, separated by 0.8 m. A combined Analysis of Variances was done and the means was separated by LSD. To estimate adaptability and stability of hybrids and environments, AMMI and GGE Bi-plot and SREG technique were used. The statistical analysis indicated significant differences ( $P < 0.01$ ) among Genotypes, Environments and the Genotype-Environment Interaction, indicating the differential response of hybrids confronted with different environments. The hybrid P-0105 was superior to all others, with mean yield of 8.01 t/ha. This genotype was followed by the hybrid group formatted by 30S-40, PB-0103, P-0512, P-0102, 30F-80 and DK-466 with yields above 7 t/ha. The stability analysis identified the hybrid P-0102 like the most stable. The analysis of rainfall measured during crop development this year, defined three locality groups related with the flowering phase (51-80 dap) and grain fill phase ( $>80$  dap) stress suffered. The group of three localities without water stress surpassed in 1.21 and 2.02 t/ha the other two environments groups.

**Key words:** Corn, hybrids, Biplot GGE-SREG, stability, rainfall effect.

<sup>1</sup> Recibido: 2 de mayo, 2006. Aceptado: 17 de julio, 2006.

<sup>2</sup> Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), CIA Azuero, "Ing. Germán De León", Los Santos, Panamá, Email: gordon.roman@gmail.com

<sup>3</sup> Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), CIA Recursos Genéticos "Ing. Alfonso Alvarado", Río Hato, Panamá Email: icamargo@cwpanama.net

<sup>4</sup> Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), CIA de Azuero "Ing. Germán De León", Los Santos, Panamá.

## INTRODUCCIÓN

La selección de genotipos que interaccionen lo menos posible con el ambiente, ha sido uno de los principales objetivos en los programas de mejoramiento genético tanto de las instituciones estatales como de las empresas que se dedican a la venta de germoplasma. La evaluación de genotipos a través de distintos ambientes, principalmente en ambientes contrastantes, es una de las prácticas más usuales para la recomendación de nuevos materiales a los productores de una región o zona específica. La Interacción Genotipo-Ambiente (IGA) ocurre cuando hay respuestas diferentes de los genotipos en relación con la variación del ambiente. Esta interacción merece gran importancia en la evaluación de híbridos desarrollados para diferentes circunstancias de producción, es necesario integrar los conceptos de adaptabilidad y estabilidad para definir el comportamiento de genotipos evaluados a través de ambientes contrastantes. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de los genotipos de aprovechar ventajosamente los estímulos del ambiente, en cuanto que la estabilidad se refiere a la capacidad de los genotipos de mostrar un comportamiento altamente previsible en función del estímulo ambiental. Por otro lado, independientemente de la metodología empleada para estimar la IGA, hay que tener claro a cual concepto de estabilidad se refiere. Becker (1981); Lin *et al.* (1986); Becker y León (1988), definen conceptos de estabilidad fenotípica que se complementan del punto de vista estadístico, biológico y agronómico.

Allard y Hansche (1969); citados por Márquez (1991), definen a una variedad estable como una variedad con capacidad de amortiguamiento o flexibilidad para cambiar en actitud, que para el caso de variedades agrícolas, significaría ajustar su rendimiento a las condiciones ambientales, es decir, variedades capaces de ajustar sus procesos vitales para mantener la productividad. Por otro lado Simmonds (1962), citado por Márquez (1991), resalta que el término adaptabilidad se ha tomado como la capacidad para responder a la selección, lo cual implica la variabilidad genética. En estas condiciones una población genotípicamente heterogénea será adaptable a diferentes ambientes al estar sujeta a diferentes presiones de selección, manifestando su adaptación específica a un ambiente de acuerdo a la presión de selección de éste, mediante su respuesta cambiante a los diferentes ambientes, se medirá la adaptabilidad.

El análisis de varianza y regresión conjunta, es una metodología empleada ampliamente para explicar la IGA (Finlay y Wilkinson 1963; Eberhart y Russell 1966; Perkins y Jinks 1968). Técnicas multivariadas también han sido usadas para estudiar los efectos de la IGA; por ejemplo, el análisis de componentes principales (PCA), análisis de coordenadas principales, análisis de cluster (Crossa 1990; Westcott 1986). El desarrollo del modelo AMMI (Efectos principales aditivos e interacción multiplicativa), que integra análisis de varianza y de componentes principales (Zobel *et al.* 1988), ha mostrado su eficiencia para explicar una proporción de la suma de cuadrados de la interacción, superior a la obtenida con el análisis de varianza y regresión conjunta (Gauch y Zobel 1988; Zobel *et al.* 1988; Crossa 1988; Crossa 1990; Crossa *et al.* 1990; Crossa *et al.* 1991). El presente trabajo se realizó con el objetivo de identificar híbridos promisorios, con buena estabilidad de rendimiento y características agronómicas deseables, bajo diversos ambientes de Panamá; además se buscó determinar la adaptabilidad y estabilidad de 14 híbridos comerciales y experimentales de grano amarillo y blanco generados por IDIAP y compañías privadas en nueve ambientes de la Región de Azuero.

## MATERIALES Y MÉTODOS

### Ubicación

El experimento se estableció en nueve localidades de la Región de Azuero, en parcelas facilitadas por productores de maíz de las provincias de Herrera y Los Santos, durante la segunda época de siembra del año 2005 (Cuadro 1).

### Características edáficas

Antes de la siembra de los ensayos se obtuvieron varias muestras de suelo para su análisis físico-químico en cada localidad. Las mismas se tomaron en cada uno de los bloques a una profundidad de 0-20 cm. Estas fueron homogenizadas y enviadas al Laboratorio de Suelos del IDIAP, en donde se les realizó el análisis según Díaz-Romeu y Hunter (1978). El análisis preliminar de suelo de los sitios, mostró la variabilidad natural que se encuentra en la región maicera de Azuero, en donde los suelos varían de muy ácidos (pH 4,4) a poco

**Cuadro 1.** Ubicación, fecha de siembra y cosecha del ensayo de evaluación de híbridos de maíz establecido en nueve localidades. Azuero, Panamá, 2005.

No.	Localidad	Distrito	Latitud	Longitud	Fecha de siembra	Fecha de cosecha
<b>Herrera</b>						
1	Las Cabras	Pesé	7°52.597'	80°32.745'	14-09-05	13-01-06
<b>Los Santos</b>						
2	El Ejido	Los Santos	7°54.488'	80°22.307'	31-08-05	13-01-06
3	Sabana Grande	Los Santos	7°50.197'	80°22.382'	20-09-05	12-01-06
4	Guararé	Guararé	7°49.149'	80°17.436'	09-09-05	06-01-06
5	La Enea	Guararé	7°51.082'	80°16.467'	02-09-05	04-01-06
6	Las Cocobolas	Las Tablas	7°47.024'	80°14.976'	05-09-05	05-01-06
7	Paraíso	Pocrí	7°41.001'	80°08.350'	08-09-05	05-01-06
8	Pocrí	Pocrí	7°39.145'	80°07.186'	13-09-05	11-01-06
9	Mariabé	Pedasí	7°33.154'	80°02.965'	15-09-03	10-01-06

ácidos (pH 6,5), con texturas que van de franco-arenosos hasta franco-arcillosos. En cuanto a la fertilidad, todos son bajos en fósforo con excepción de las localidades en Sabana Grande y Guararé, medio en Potasio, bajos en Aluminio y altos en Calcio y Magnesio. El porcentaje de materia orgánica es considerado bajo y el mismo osciló entre 1,07 a 2,22% (Cuadro 2).

### Características climáticas

Se tomaron datos de precipitación pluvial en ocho pluviómetros ubicados en zonas adyacentes a los ensayos. La precipitación pluvial registrada durante el año

2005 fue de 1.616,0 mm y la misma está por encima del promedio del período 1995-2005. En los meses previos a la siembra de los ensayos de este año (abril-agosto), se registró una precipitación acumulada promedio de 812,3 mm, mientras que en el período de septiembre a diciembre la media registrada fue de 803,7 mm; ambos valores están por encima de la media de la precipitación del período 1995-2005 (626,8 y 633,6 mm, respectivamente).

Durante el mes de septiembre, se registró una precipitación por debajo del promedio anual de la Región (211 mm) en las localidades de París, El Ejido, Ciénega Larga y Guararé, mientras que en las otras cuatro se

**Cuadro 2.** Principales características físico químicas de los suelos donde se efectuaron los ensayos, Azuero, Panamá, 2005.

Localidad	Arena	Limo	Arcilla	pH	P	K	Ca	Mg	Al	M.O.	Mn	Fe	Zn	Cu	Text
	(%)				(µg/ml)		(meq/100ml)			(%)	(µg/ml)				
El Ejido	54	18	28	4,9	2	86	6,5	4,2	0,3	2,22	54	14	1	2	FARA
La Enea	68	20	12	4,4	8	82	1,4	2,0	0,7	1,28	56	22	9	1	FA
Cocobolas	38	22	40	5,1	8	102	6,4	6,0	0,3	1,07	55	15	1	7	FARC
Paraíso	34	26	40	4,7	2	188	11,2	11,1	0,2	1,57	38	15	1	2	FARC
Guararé	48	20	32	6,1	42	156	23,0	4,6	0,1	1,47	36	27	1	1	FARA
Pocrí	40	32	28	5,8	7	167	8,8	4,0	0,7	1,76	32	27	1	2	FARC
Las Cabras	40	32	28	5,0	5	82	13,1	5,6	0,5	1,57	109	20	1	1	FARC
Mariabé	36	32	32	5,4	1	141	9,0	4,9	0,1	1,17	48	22	1	4	FARC
Sabana Grande	56	26	18	6,5	226	239	18,5	5,8	0,2	1,37	26	20	2	1	FA

M.O. = Materia orgánica; Text = Textura; FARC = franco arcilloso, FARA = franco arcillo-arenoso, FA = Franco arenoso

observaron precipitaciones por encima de éste. El mes de octubre registró lluvias dentro los parámetros normales en la mayoría de las localidades, con excepción de Pocrí, que presentó un registro de 502,1 mm. El mes de noviembre tuvo similar comportamiento que el mes de septiembre con registros por debajo de la media (251,4 mm) en las localidades ubicadas al norte de la Península. Cabe destacar, que la media de este mes fue superior al promedio de los últimos once años en donde se lleva el registro de estos mismos pluviómetros. Diciembre se caracterizó por presentar un incremento en la precipitación, principalmente de los pluviómetros ubicados en Pocrí y Pedasí, en las otras localidades la precipitación fue menor que la media de todas las localidades, excepto Ciénega Larga que registró valores que no difieren del promedio general del año (Cuadro 3). De manera general los cuatro pluviómetros ubicados en los distritos ubicados al norte de la península (Parita, Los Santos y Guararé) presentaron registros por debajo del promedio (803,7 mm) en el período de desarrollo del cultivo (septiembre-diciembre), mientras que los ubicado más al sur (Las Tablas, Pocrí y Pedasí) los registros superaron los 800 mm en el mismo período.

### Material genético

Los híbridos evaluados fueron obtenidos de diferentes fuentes. Las compañías privadas suministraron ocho genotipos, mientras que el sector oficial contribuyó con seis. El ensayo incluyó once genotipos con grano de color amarillo y tres de color blanco (Cuadro 4).

**Cuadro 4.** Nombre, tipo, color del grano y origen de híbridos de maíz evaluados. Azuero, Panamá, 2005.

No.	Híbrido	Color del grano	Tipo	Origen
1	30K-75	Amarillo	Simple	Pioneer
2	30F-80	Amarillo	Simple	Pioneer
3	30P-70	Amarillo	Simple	Pioneer
4	DK-466	Amarillo	Triple	Dekalb
5	30S-40	Amarillo	Triple	Pioneer
6	30F-87	Amarillo	Triple	Pioneer
7	3031	Amarillo	Doble	Pioneer
8	30R-92	Blanco	Doble	Pioneer
9	PB-0103	Blanco	Triple	IDIAP
10	PB-0105	Blanco	Triple	IDIAP
11	P-0408	Amarillo	Triple	IDIAP
12	P-0512	Amarillo	Triple	IDIAP
13	P-0102	Amarillo	Triple	IDIAP
14	P-0104	Amarillo	Triple	IDIAP

### Manejo agronómico

El sistema de preparación del suelo de los experimentos fue el convencional; el mismo consistió en dar de dos a tres pases de rastra pesada hasta dejar el suelo desmenuzado. La densidad inicial de siembra utilizada fue de 6,25 plantas/m<sup>2</sup>, esto se logró al sembrar en surcos separados a 0,80 m y dejar una planta cada 0,20 m. La fertilización consistió en la aplicación de 227 kg/ha de la fórmula química 12-24-12 al momento de la

**Cuadro 3.** Precipitación pluvial (mm) en ocho pluviómetros de la Región de Azuero, Panamá 2005.

Localidad	París	El Ejido	Ciénega Larga	Guararé	Tablas Abajo	Las Cocobolas	Pocrí	Pedasí	Prom. 2005	Prom. 95-05
Abr	35,0	16,0	35,0	9,7	1,4	5,0	0,0	7,4	27,2	13,8
May	116,0	171,0	106,5	144,5	141,7	286,9	240,0	171,5	162,6	119,3
Jun	273,0	247,0	182,0	127,0	244,9	197,8	232,1	248,0	230,7	149,0
Jul	55,0	102,0	131,5	142,3	205,6	275,0	378,5	345,9	194,6	175,9
Ago	107,0	113,0	105,5	133,5	163,8	199,6	247,4	604,7	197,1	164,0
Sep	201,0	131,0	115,5	170,2	228,4	217,0	318,0	305,4	211,0	171,3
Oct	260,0	205,0	218,0	210,4	317,9	222,8	502,1	217,8	259,4	214,0
Nov	143,0	193,0	212,0	124,6	325,6	311,6	362,1	395,1	251,4	182,7
Dic	14,0	30,0	80,0	25,8	61,9	76,9	266,5	144,6	81,8	65,6
Total	1.204,0	1.208,0	1.186,0	1.088,0	1.691,2	1.792,6	2.546,7	2.440,4	1.616,0	1.260,3
Abr-Ago	586,0	649,0	560,5	557,0	757,4	964,3	1098,0	1377,5	812,3	626,8
Sep-Dic	618,0	559,0	625,5	531,0	933,8	828,3	1448,7	1062,9	803,7	633,6

siembra, en forma de banda continua a 4 cm de la línea de siembra. Posteriormente, se realizaron dos aplicaciones suplementarias de urea, la primera a los 20 días después de siembra (dds) a razón de 159 kg/ha y la segunda a los 37 dds a razón de 204 kg/ha. En total se aplicó 194 kg N, 54 kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> y 27 kg K<sub>2</sub>O/ha.

El control de malezas consistió en la aplicación en pre-emergencia de la mezcla de atrazina más pendimetalina a razón de 1,5 y 1,65 kg i.a./ha, respectivamente. En algunas localidades, por la presencia de malezas de mayor tamaño, se añadió a la mezcla 1,84 kg i.a./ha de glifosato. En la localidad de Las Cabras se realizó una aplicación suplementaria a los 12 dds del herbicida halosulfurón metil en dosis de 60 g i.a./ha para el control del *Cyperus rotundus*.

### Variables medidas

Los datos tomados incluyeron caracteres cuantitativos, que son altamente influenciados por el ambiente como: altura de planta y mazorca, rendimiento de grano, porcentaje de plantas acamadas, porcentaje de mazorcas podridas y caracteres cualitativos, que son pocos influenciados por el ambiente, como: días a floración femenina, número de plantas y mazorcas al momento de la cosecha, humedad del grano y la evaluación de las principales enfermedades al follaje (*Curvularia* sp. y *Puccinia* sp.). Para la evaluación de enfermedades se utilizó una escala de 1 a 5, donde 1 indica ausencia de enfermedad y 5 infección muy severa. La evaluación se realizó en las etapas finales (70-80 dds) del cultivo, antes que las hojas se tornaran de color café.

### Diseño experimental

Las parcelas experimentales consistieron de dos surcos de 5,2 m de largo. Para la ejecución en campo se utilizó el diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones, de acuerdo al siguiente modelo matemático:

$$X_{IJL} = \mu + G_I + B_{J/L} + A_L + (GA)_{IL} + e_{IJK}$$

En donde:

$X_{IJL}$  = Valor del carácter estudiado

$\mu$  = Media general

$G_I$  = Efecto de Genotipo

ISSN: 1021-7444

$B_{J/L}$  = Efecto de bloques dentro de repetición

$A_L$  = Efecto de ambiente

$(GA)_{IL}$  = Efecto de la interacción Genotipo Ambiente

$e_{IJK}$  = Error Experimental

### Análisis estadístico

Se realizó un análisis de varianza combinado, considerando un modelo mixto (ambiente aleatorio y genotipo fijo). Para la separación de medias de rendimiento se aplicó la diferencia mínima significativa (DMS). Para el análisis de las variables porcentaje de plantas acamadas y porcentaje de mazorcas podridas, los valores fueron transformados por el método de la raíz cuadrada más un medio ( $\sqrt{x + 0,5}$ ).

### Análisis de estabilidad

Para el análisis de estabilidad se utilizó el modelo AMMI Biplot GGE-SREG, que integra el análisis de varianza y el análisis de componentes principales (Zobel *et al.* 1988; Yan *et al.* 2000). El modelo matemático es:

$$Y_{ge} = \mu + \alpha_g + \beta_e + \sum^N \lambda_n Y_{gn} \delta_{en} + \rho_{ge}$$

En donde:

$Y_{ge}$  = Rendimiento promedio de un genotipo g en un ambiente e

$\mu$  = Media general

$\lambda_n$  = Es el valor singular para el PCA

$N$  = Número de PCA retenidos en el modelo

$Y_{gn}$  = Son los valores de vectores de los genotipos (PCA)

$\alpha_g$  = Efecto de las desviaciones de las medias de los genotipos

$\beta_e$  = Efecto de las desviaciones de las medias del ambiente

$\delta_{en}$  = Son los valores de los vectores para cada ambiente (PCA)

$\rho_{ge}$  = Residual

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### Análisis de varianza

En el Cuadro 5 se presenta el resumen de los análisis de varianza combinados del rendimiento y

AGRONOMÍA MESOAMERICANA 17(2): 189-199. 2006

**Cuadro 5.** Cuadrados medios y significancia encontrada en el análisis de varianza combinado del rendimiento y otras características agronómicas evaluadas en el ensayo regional de maíz. Azuero, Panamá. 2005.

F. de V	g.l.	Rend	AlPt	Ptm <sup>2</sup>	Mzm <sup>2</sup>	Mz/pt	PMz	Aca	Pud	Roya	Curv	AlMz/ AlPt
Ambiente	8	41,57**	16174**	1,20**	1,00*	0,013**	14845**	0,237**	0,0011**	1,875**	3,59**	0,026**
Rep (Amb)	18	2,55	833,7	0,13	0,23	0,002	500,1	0,006	0,0003	0,206	0,19	0,002
Genotipo	13	3,93**	3252,5**	0,46**	0,56**	0,008**	1045,9**	0,086**	0,0014**	1,773**	0,76**	0,012**
Gen x Amb	104	1,34**	138,2**	0,16**	0,27**	0,002 <sup>n.s.</sup>	289,5**	0,012**	0,0003**	0,161**	0,11**	0,001**
Error	234	0,55	101,5	0,06	0,12	0,002	138,7	0,003	0,0002	0,079	0,068	0,001
C.V. (%)		10,5	4,2	4,3	5,9	4,6	9,6	7,2	2,1	10,7	10,5	5,8

\*\* , \* = diferencias estadísticas con probabilidad menor al 1, 5 %, n.s.= Efecto no significativo.

Rend = Rendimiento de grano, AlPt = Altura de planta, Ptm<sup>2</sup> = Plantas por metro cuadrado, Mzm<sup>2</sup> = Mazorcas por metro cuadrado, Mz/Pt = Mazorcas por planta, PMz = Peso de mazorcas, Aca = Porcentaje de plantas acamadas, Pud = Porcentaje mazorcas podridas, Curv = Curvularia, AlMz/AlPt = Relación altura de mazorca y altura de planta.

algunas características agronómicas, donde se observa que hubo diferencia altamente significativa entre ambientes, híbridos y la interacción de ambos factores en todas las variables evaluadas, excepto en la interacción genotipo ambiente de la variable mazorcas por planta.

### Efecto de ambientes

De acuerdo al análisis de varianza el ambiente capturó el 47,7% de la suma de cuadrados total del experimento. El Cuadro 6 presenta el rendimiento de grano y algunas de las variables medidas por

**Cuadro 6.** Fecha de siembra, promedio de rendimiento y otras características agronómicas de la Prueba Regional de maíz según localidades, Azuero, Panamá, 2005.<sup>1, 2</sup>

	Fecha siembra	ppt (mm)			Rend. (t/ha)	Plantas/m <sup>2</sup>	Altura planta (cm)	Mazorca planta	Peso mazorca (g)	Pudrición (%)	Acame (%)	Altura mazorca/Altura planta
		31-50 dds <sup>a</sup>	51-80 dds <sup>b</sup>	81-100 dds <sup>c</sup>								
Nueve localidades												
		213,2	263,5	110,2	7,04	6,02	2,40	0,96	122,3	2,3	18,8	0,54
Grupo ambiental A												
Paraíso	08-09	389,6	400,1	266,5	7,36	6,15	255	0,96	124,6	1,8	9,9	0,55
Pocrí	13-09	442,6	322,0	266,5	8,06	5,60	233	0,97	149,1	2,9	0,6	0,53
Mariabé	15-09	219,4	327,9	144,6	8,94	6,02	263	0,96	154,6	2,2	1,8	0,52
Promedio		350,5	350,0	225,9	8,12	5,92	250	0,96	142,8	2,3	4,1	0,53
Grupo ambiental B												
El Ejido	31-08	152,0	194,0	82,0	6,87	6,03	227	0,95	119,5	3,0	15,2	0,55
La Enea	02-09	94,6	252,5	80,9	7,18	6,07	236	0,97	121,4	2,7	35,7	0,54
Cocobolas	05-09	158,7	381,4	69,4	6,68	6,17	252	0,92	117,9	2,5	20,4	0,54
Promedio		135,1	276,0	77,4	6,91	6,09	238	0,95	119,6	2,7	23,8	0,54
Grupo ambiental C												
Guararé	09-09	153,6	193,6	52,9	6,53	6,10	264	0,97	110,8	3,2	25,8	0,56
Las Cabras	14-09	217,0	130,0	14,0	6,07	5,94	204	0,98	104,1	1,6	32,3	0,49
Sba Grande	20-09	91,0	170,0	15,0	5,72	6,09	230	0,96	98,5	1,0	27,3	0,57
Promedio		153,9	164,5	27,3	6,10	6,04	233	0,97	104,5	1,9	28,5	0,54

<sup>1</sup> ppt = precipitación, <sup>2</sup> dds = días después de siembra; <sup>a</sup> Pre floración; <sup>b</sup> Floración/llenado; <sup>c</sup> Llenado de grano.

localidad. El rendimiento promedio a través de las nueve localidades fue de 7,04 t/ha, éste fue afectado por la distribución de las lluvias en las distintas etapas fenológicas del cultivo. Algunas localidades fueron afectadas por estrés hídrico en la etapa de floración (51-80 dds) y en mayor medida durante la fase de llenado del grano (81-100 dds) a pesar de que en general el promedio del período en que se desarrolló el cultivo fue superior al promedio del período 1995-2005.

La información generada en el ensayo permitió identificar tres grupos ambientales o dominios de recomendación. El primer grupo (Grupo ambiental A) lo conformaron las localidades ubicadas al sur de la península como lo son Paraíso, Pocrí y Mariabé; este grupo tuvo en común una precipitación promedio de 350,0 y 225,9 mm en las fases de floración/llenado (51-80 dds) y llenado del grano (>80 dds), respectivamente. El segundo grupo (Grupo ambiental B) agrupó los ensayos sembrados en El Ejido, La Enea y Las Cocabolas con precipitaciones acumuladas de 276,0 y 77,4 mm en las fases analizadas. Estas localidades están ubicadas en una zona con mayor probabilidad de sufrir estrés hídrico en las últimas fases del cultivo, cuando se siembra después del 15 de septiembre (Gordón *et al.* 2004); estos registros representan una reducción de 21,2 y 65,7% en las fases analizadas al compararse con las localidades del Grupo A. El tercer grupo (Grupo ambiental C) estuvo formado por los ensayos sembrados en Guararé, Sábana Grande y Las Cabras, los mismos están ubicados geográficamente en la misma zona que los ensayos del Grupo B; al ser sembrados los ensayos más tarde, el registro de lluvias fue de 164,5 y 27,3 mm en dos de las tres fases críticas del cultivo. Estos promedios representan una reducción de 53,0 y 87,9 % en relación al registro del Grupo A y de 40,4 y 64,7% menos lluvia con respecto al Grupo B. La baja precipitación pluvial en la fase floración/llenado en las localidades del Grupo B, se tradujo en rendimientos menores de 7,2 t/ha y pesos de mazorcas menores de 122 g, lo que representó en promedio una reducción del rendimiento de grano de 14,9% (1,21 t/ha) con respecto a los ensayos del grupo A. En los ensayos del Grupo C el estrés hídrico experimentado en las dos fases representó una mayor merma en el rendimiento, la cual fue de 11,7 % (0,80 t/ha) con respecto al Grupo B y de 24,8% (2,02 t/ha) en relación al promedio del Grupo A.

En relación a las variables plantas por metro cuadrado, relación entre las alturas de mazorca, número de

mazorcas por planta y el porcentaje de mazorcas podridas no fueron afectadas por las diferencias presentadas entre los tres grupos ambientales. La variable porcentaje de plantas acamadas varió grandemente entre los tres grupos, observándose un incremento en el porcentaje a medida que la localidad fue sometida a un mayor estrés, esto se puede explicar a que mayor estrés, la planta presenta un menor vigor lo que se traduce en una mayor propensión al acame. El otro factor que se vio afectado fue la altura de planta, de manera que a mayor estrés en las localidades, menor tamaño de planta provocado por el acortamiento de los entrenudos.

### Efecto de genotipos

El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas entre los distintos híbridos evaluados para la variable rendimiento de grano; logrando capturar el 7,3% de la suma de cuadrados del análisis de varianza de esta variable. El Cuadro 7 muestra la media de rendimiento de las nueve localidades, así como el comportamiento de los híbridos en los tres grupos ambientales definidos.

De los híbridos evaluados, siete superaron en rendimiento a la media general, sobresaliendo de manera significativa el híbrido PB-0105 con media de 8,01 t/ha. Siguieron a este genotipo el grupo formado por los híbridos 30S-40, PB-0103, P-0512, P-0102, 30F-80 y DK-466 con rendimientos promedio superiores a 7 t/ha (7,38; 7,30; 7,24; 7,19; 7,16 y 7,10 t/ha, respectivamente). Un tercer grupo de híbridos estuvo conformado por 30K-75, P-0104, P-0408, y 30P-70, los cuales presentaron rendimientos promedios arriba de las 6,77 t/ha. Se observó que los híbridos más afectados por el déficit hídrico fueron 30S-40, P-0102, DK-466 y 30F-87, con mermas superiores a las 2,50 t/ha. Mientras que los menos afectados fueron los híbridos con el menor promedio 3031 y 30R-92 con reducciones menores de 0,56 y 1,07 t/ha.

En cuanto a la población de plantas, al momento de la cosecha no se encontró diferencias estadísticas significativas entre ninguno de los híbridos mencionados, lo que sugiere que las diferencias en rendimientos son debidas al potencial de rendimiento y adaptabilidad de cada uno de ellos y no de la cantidad de plantas cosechadas. En relación a las otras características evaluadas, los promedios obtenidos para cada una de las variables a través de las nueve localidades se







